

*Medisch dossier van mijn moeder Janneke van Veen Nieuwegein.
periode 1993-2004 aangevraagd in juli 2019.*

PTA, dotteren Percutane (door de huid) Transluminale (in de slagader) Coronaire artherie (kransslagader) Angioplastiek (het opnieuw vormen van een bloedvat) (PTA), dotteren en aanbrengen van een stent.

Amaurosis fugax of vluchtige blindheid is het verschijnsel dat mensen plotseling en kortdurend met één oog niet meer kunnen zien. Het wordt meestal veroorzaakt door een onderbreking van de bloedtoevoer naar het netvlies, een van de meest gevoelige weefsels van het lichaam voor zuurstofgebrek.

Bijwerkingen cholesterolverlagers: hersenafbraak/geheugenverlies.

HNP Hernia Nuclei Pulposi L5-S1) operatie, hernia (uitstulping van de tussenwervelschijf) uitstulping weggehaald, die op een zenuw kan drukkend, pijn in benen als gevolg.

1993 onderwandinfarct

- actilyse via infuus, medicijn om bloedstolsels op te lossen
- PTCA, dotteren zonder stent

2000 pancreatitis (alvleesklierontsteking)

2001 december amaurosis fugax (tijdelijke blindheid) in linkeroog

2002 voorbereiding hartoperatie. Naast hartklep vervangen, zouden er ook nog 3 bypasses worden verricht.

26 juli 2002 brief neuroloog Frequin aan antroposofisch huisarts Paul Hutchison, kopie naar Bronovo en aan Moll algemeen chirurg. 21 juni en 25 juli 2002 is mijn moeder op de polikliniek neurologie in Antoniuszeikenhuis in Nieuwegein geweest. Medicatie 4 medicijnen : Metformine, Glibenclanide, Ascal-cardio, Lipitor, cholestrolverlager met 'bijwerking' dementie.

- 20 september 2002 brief Sjef Ernst (Antoius) aan collega cardioloog Dijkman (Bronovo) schijft aortaklep stemose en mammaaria met hoofdstamstenose

2003 18 augustus uitstel operatie 25 augustus op verzoek van mijn moeder

2003 9-19 september afdeling cardio thoracale chirurgie van St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in verband met Bentall procedure hartklep vervanging in de aorta (grootste slagader van het hart). Myocardrevascularisatie (hartspier doorbloeding.)

2003 september medicatie bij ontslag:

- sintron mitis (volgens afspraak) medicijn anti stolling van bloed.
- paracetamol (zonodig)
- glybenclamiden 5 mg (hoogste dosering) 3x per dag, zeer sterk bloedsuikerverlagend middel, werkt sterker dan metformine (wat mijn moeder ook al kreeg. Vooral bij ouderen verhoogd risico op hypoklmie (te lage bloedsuikerspiegel)
- metformine 500 mg 3x pr dag.
- pantozol 40 mg 1x per dag maagbescherming.
- plavix 75 mg 1x per dag antibloedstollingsmedicijn met als belangrijkste werkzame stof: Clopidogrel
Bijwerkingen: hoofdpijn, verwardheid, hallucinaties, gewrichtspijn, huiduitslag, jeuk ('familiekwaal'), blauwe plekken of inwendige bloedingen, smaakverandering. Min vader kookte steeds vaker, mijn moeder vond niets meer lekker.
- capoten 12,5 mg 3x per dag bloeddrukverlagend medicijn. Extra voorzichtig als er sprake is van suikerziekte en daarvoor wordt behandeld.

11 september 2003 bypass operatie 3 distale anastomose verricht.

Na de operatie pijnlijk linkeroor.

23 december 2003 controle CT-scan in Antoniusziekenhuis Nieuwegein door dr. Heijmen.

4 januari 2004 CT-scan in Antoniusziekenhuis in Nieuwegein door cardio-thoracaalchirurg dr. Heijmen. Daarna zijn vanwege de grote reistijd de vervolgsafspraken in ziekenhuis Bronovo in Den Haag.